

PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
UTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación y el contacto con la piel y los ojos. Finalizados los tratamientos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante la preparación y aplicación. Usar durante la aplicación antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la dilución del producto.

RIESGOS AMBIENTALES: **Toxicidad para aves:** Prácticamente no tóxico; no dejar semillas tratadas sobre la superficie del suelo. **Toxicidad para peces:** Moderadamente tóxico; no contaminar fuentes de agua. **Toxicidad para abejas:** Virtualmente no tóxico; no representa riesgo para las abejas debido a su modo de aplicación.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser almacenado en su envase cuidadosamente cerrado, en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. El caldo remanente no se podrá reutilizar. Para eliminarlo en forma segura, sin contaminar fuentes de agua, debe diluirse el producto remanente al 5% con agua limpia y pulverizarlo sobre alambrados, campo arado, rastrojos no pastoreables o caminos de tierra.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Identificarlos para su posterior destrucción. Los envases deben ser totalmente vaciados y se les debe realizar el triple lavado. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción en una Planta de tratamiento, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente, siguiendo reglamentaciones provinciales o nacionales.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original bien cerrado, almacenado en locales seguros, secos, ventilados a resguardo de la luz solar y alejado de alimentos, semillas, forrajes y fertilizantes.

DERRAMES: En caso de producirse un derrame absorber el producto con cal, aserrín, tierra u otro material absorbente y colocarlo en un recipiente bien cerrado e identificado para su posterior eliminación. Evitar contaminar alcantarillas, depósitos o cursos de agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental dar a beber dos vasos de agua. No inducir el vómito. Nunca administrar nada por boca ni inducir al vómito a una persona inconsciente. Requerir inmediata atención médica. **Contacto con la piel:** quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Si aparece irritación persistente buscar atención médica. **Contacto ocular:** Lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados. Si aparece irritación persistente buscar atención médica. **En caso de inhalación:** alejar al paciente del lugar de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO - CLASE III. Categoría **inhalatoria II (NOCIVO)**, Moderado irritante dermal – Categoría **III (CUIDADO)** Evitar el contacto con la piel y la ropa. No irritante ocular. No sensibilizante dermal. No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Náusea, vómitos, malestar general, cefalea, irritación ocular, lagrimeo.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-2247 y 4962-6666, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Hospital de Clínicas José de San Martín, Tel.: (011) 5950-8804 y 06, Centro de Consultas Toxicológicas Rosario, Tel (0341) 4242727-4480077, Hospital Municipal de Infantes Córdoba, Tel. (0351) 4718785-4718165.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros fungicidas.

FUNGUICIDA

Terápico para el tratamiento de semillas

Grupo:3



Suspensión concentrada para el tratamiento de semillas

COMPOSICIÓN

tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil)etil]-alfa-(1-dimetiletil)-1 H-1,2,4	6 g
inertes, c.s.p.	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N° 35.794

N° DE LOTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: / /

ORIGEN: ARGENTINA

CONT.
NETO 1LT.

PRODUCTO NO INFLAMABLE



Fabricado por:
Est. N° A-00789. SAGPyA
Bv.E.López N°56 - 2107 Soldini
Santa Fe - Argentina

DISTRIBUYE: Laboratorio Quimeco S.R.L.
Av. Las Palmeras 1452, U.18 (P.I.M.), 2121 Pérez
Santa Fe - Argentina. Tel. (0341) 432 7472
E-mail: info@quimeco.com.ar

Nota: Dada la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto, la Empresa no se responsabiliza por los daños y/o perjuicios derivados de los mismos.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

TEBUCO 6 es un fungicida orgánico que pertenece al grupo de los triazoles. Posee acción sistémica preventiva, curativa y erradicante sobre los patógenos que actúan en la etapa de germinación de las semillas e implantación del cultivo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Tratamiento húmedo: aplicar la dosis recomendada de TEBUCO 6 diluida en 1,5 a 1,6 litros de agua / 100 kg de semilla.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Introducir una cantidad determinada de semillas dentro del equipo de curado (tambor rotativo de eje excéntrico, tolva mezcladora de cemento u otro implemento que permita la distribución uniforme del producto en la semilla), humedecer la semilla con el caldo de curado paulatinamente, manteniendo el implemento de rotación en movimiento hasta tanto se compruebe que el producto ha entrado en contacto con la totalidad de la semilla, curándola uniformemente.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de aplicación
Trigo	Carbón cubierto o hediondo (<i>Tilletia caries</i> ; <i>Tilletia foetida</i>), Carbón volador (<i>Ustilago nuda</i> f. <i>Sp. Tritici</i>), Fusariosis o Golpe blanco (<i>Fusarium graminearum</i>)	42 cm ³ / 100kg	Tratamiento húmedo: aplicar la dosis recomendada del producto suspendida en 1,5 - 1,6 litros de agua por cada 100 kg de semilla en equipos curasemillas adecuados para tal fin.
Arroz	Complejo de hongos causantes del Damping-off (<i>Alternaria padwickii</i> ; <i>Sclerotium rolfsii</i> ; <i>Pyricularia oryzae</i>), Patógenos de la semilla (<i>Phoma spp</i> ; <i>Bipolaris spp</i> ; <i>Gerlachia oryzae</i> ; <i>Alternaria padwickii</i>)		

TEBUCO 6 no altera el poder germinativo de las semillas.

RESTRICCIONES DE USO: No corresponde por tratarse de un terapico para tratamiento de semillas. La semilla tratada será destinada únicamente a la siembra, no siendo apta para la alimentación, forraje o extracción de aceite. La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, esta penada por la ley 18.073, que prohíbe la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados a consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicida o insecticida) en granos para consumo, la ley establece severas penas a los infractores. Recuerde que una bolsa de semilla tratada, mezclada en varios silos de grano para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa. "En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD: En caso de mezclar con insecticida terapico para tratamiento de semillas, utilizar Imidacloprid Pericon (imidacloprid 60% FS). Para cualquier otra mezcla realizar una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico, empleado a la dosis y en los cultivos indicados.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO



CUIDADO



PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS
NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA
ATENAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación y el contacto con la piel y los ojos. Finalizados los tratamientos lavarse prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante la preparación y aplicación. Usar durante la aplicación antiparras, guantes, botas de goma y ropa protectora adecuada. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la dilución del producto..

RIESGOS AMBIENTALES: Muy tóxico para aves: no dejar semillas tratadas sobre la superficie del suelo. Moderadamente tóxico para peces: no contaminar fuentes de agua. Altamente tóxico para abejas: no representa riesgo para las abejas debido a su modo de aplicación.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Verter la totalidad del contenido del envase, cuidando de escurrirlo bien, en el tanque de aplicación para el tratamiento de semillas. Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos utilizados, incluyendo los equipos de seguridad.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Identificarlos para su posterior destrucción. Los envases deben ser totalmente vaciados y se les debe realizar el triple lavado. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción en una Planta de tratamiento, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente, siguiendo reglamentaciones provinciales o nacionales.

ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en su envase original bien cerrado, almacenado en locales secos, secos, ventilados a resguardo de la luz solar y alejado de alimentos, semillas, forrajes y fertilizantes.

DERRAMES: Recoger el líquido derramado con un material absorbente como arena, tierra o diatomeas. Evitar las salpicaduras del material. Recolectar el material en recipientes bien cerrados e identificados para su posterior destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos bien con abundante agua durante 10 minutos. En caso de ingestión, consultar a un Centro de Toxicología indicando el nombre de la sustancia activa y del producto. PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO - CLASE II
Toxicidad Inhalatoria: CATEGORÍA II (NOCIVO). Leve irritante dermal – CATEGORÍA IV (CUIDADO)
Leve irritante ocular – CATEGORÍA IV. No sensibilizante dermal. No existe antídoto específico:
APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han registrado en humanos. Se espera que sean similares a los producidos por el ácido nicotínico: fatiga, calambres, debilidad muscular, incluidos músculos del proceso respiratorio.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-2247 y 4962-6666. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Hospital de Clínicas José de San Martín, Tel.: (011) 5950-8804 / 06. Centro de Consultas Toxicológicas Rosario, Tel (0341) 4242727-4480077. Hospital Municipal de Infantes Córdoba, Tel. (0351) 4718785- 4718165.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinérgico o aditividad en mezclas con otros fungicidas.

INSECTICIDA

Terápico para el tratamiento de semillas

Grupo: 4



Suspensión concentrada para el tratamiento de semillas

COMPOSICIÓN

imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ildeneamina..... 60 g
 inertes, coadyuvantes y colorantes 100 cm³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 35.485

N° DE LOTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: / /

ORIGEN: ARGENTINA

CONT. NETO 1LT.

PRODUCTO NO INFLAMABLE



Fabricado por:
 Est. N° A-00789. SAGPyA
 Bv.E.López N°56 - 2107 Soldini
 Santa Fe - Argentina

DISTRIBUYE: Laboratorio Quimeco S.R.L.
 Av. Las Palmeras 1452, U.18 (P.I.M.), 2121 Pérez
 Santa Fe - Argentina. Tel. (0341) 432 7472
 E-mail: info@quimeco.com.ar



NOCIVO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: IMIDACLOPRID PERICON es un curasemillas insecticida de acción por contacto, ingestión y por vía sistémica.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACIÓN: Modo de empleo general para todas las semillas: La semilla a tratar debe ser previamente ventilada para eliminar todo resto de paja, polvo, etc. Debe tener buena energía germinativa y poder germinativo. Evitar las sub-dosificaciones de producto. El equipo a utilizar debe estar diseñado para este fin, en su defecto puede utilizarse también un tambor rotativo tipo homogeneador.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Introducir una cantidad determinada de semillas dentro del equipo de curado (tambor rotativo de eje excentrico, tolva mezcladora de cemento u otro implemento que permita la distribución uniforme del producto en la semilla), humedecer la semilla con el caldo de curado paulatinamente, manteniendo el implemento de rotación en movimiento hasta tanto se compruebe que el producto ha entrado en contacto con la totalidad de la semilla, curándola uniformemente. Aplicar las dosis recomendadas de IMIDACLOPRID PERICON en forma concentrada o diluida en la cantidad de agua suficiente para lograr un buen recubrimiento de la semilla, según el equipo para tratamiento de semilla con que se cuente. Generalmente 2 litros cada 100 kg de semilla.

RECOMENDACIONES DE USO: Recomendaciones para el tratamiento de semillas:

Algodón: Preparar el caldo de curado con la dosis de IMIDACLOPRID PERICON recomendada por cada 100 Kg de semillas y llevarla con el agregado de agua a un volumen de caldo superior a 1500 cm³/100 Kg de semillas. Introducir una cantidad determinada de semillas dentro de la herramienta de curado (tambor rotativo de eje excentrico, tolva mezcladora de cemento u otro implemento que permita la distribución uniforme del producto en la semilla), humedecer la semilla con el caldo de curado paulatinamente, manteniendo el implemento de rotación en movimiento hasta tanto se compruebe que el producto ha entrado en contacto con la totalidad de la semilla curándola uniformemente.

Lechuga: 1) Diluir en 25-50 cm³ de agua la dosis recomendada de IMIDACLOPRID PERICON (50 cm³/Kg de semilla)

2) Introducir las semillas a tratar en un recipiente limpio y seco e ir agregando de a poco el caldo de curado hasta lograr un total revestimiento de las mismas en forma homogénea.

3) Colocar las semillas en un lugar a la sombra durante aproximadamente un cuarto de hora.

Orear la semilla después del tratamiento para lograr mejor fluidez en la sembradora y evitar problemas de atascamiento al sembrar. Tratar la semilla próximo al momento de la siembra ya que este humedecimiento puede activar el proceso de germinación ocasionando una pérdida de poder germinativo u problemas de hongos.

Cultivo	Plagas que controla (Específicas)	Plagas que controla (Generales)	Dosis/100 Kg de semilla
Avena (tipo suregrain)	Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>)	Insectos de suelo: Gusanos blancos: (<i>Diloboderus abderus</i> ; <i>Cyclocephala</i> spp. <i>Colaspis</i> spp. <i>Mesocaspis</i> spp.)	175 cm ³
Algodón	Pulgón del algodónero (<i>Aphis gossypii</i>), Trips (<i>Frankliniella paucispinosus</i>), Tenebrionido del girasol (<i>Blaptinus</i> spp.)	Gusanos alambre: (<i>Dyscymetus gagates</i> , <i>Conoderus</i> spp. <i>Agriotes</i> spp.)	470 cm ³
Alfalfa	Pulgones: Azul (<i>Acyrtosiphon kondoi</i>). De la alfalfa (<i>Acyrtosiphon pisum</i>). Manchado de la alfalfa (<i>Theriacaphis trifolii</i>). Negro de las leguminosas (<i>Aphis cytisorum</i>). De las leguminosas (<i>Aphis craccivora</i>)		500 cm ³
Soja	Picudo de la soja (<i>Promecops carolinensis</i>)		50-70 cm ³
Girasol	Tenebrionido del girasol (<i>Blaptinus</i> spp.), * Hormigas		500-600 cm ³
Maiz	Vector de Mal de Rio Cuarto (<i>Delphacodes kuscheli</i>)	Insectos de suelo: Gusanos blancos: (<i>Diloboderus abderus</i> ; <i>Cyclocephala</i> spp. <i>Colaspis</i> spp. <i>Mesocaspis</i> spp.)	500-750 cm ³
Sorgo	Pulgón (<i>Rhopalosiphum maidis</i>)	Gusanos alambre: (<i>Dyscymetus gagates</i> , <i>Conoderus</i> spp. <i>Agriotes</i> spp.)	750 cm ³
Papa	Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>), Pulgón de la papa (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)		25 cm ³
Trigo	Gorgojo del trigo (<i>Lisroronus bonariensis</i>), Pulgón verde de los cereales (<i>Schizaphis graminum</i>)		60-100 cm ³

*Hormigas: Se observa un efecto adicional de repelencia a hormigas.

IMIDACLOPRID PERICON no altera el poder germinativo de las semillas.

Cultivo	Plagas que controla	Dosis
Poroto	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	70-100 cm ³ /100 Kg de semillas
Lechuga	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes</i> spp.), Pulgón de la lechuga (<i>Hyperomyzus lactucae</i>), Trips (<i>Frankliniella</i> spp.)	50 cm ³ / Kg semillas

RESTRICCIONES DE USO: No corresponde por tratarse de un terapico para tratamiento de semillas. La semilla tratada será destinada únicamente a la siembra, no siendo apta para la alimentación, forraje o extracción de aceite. La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, esta penada por la ley 16.073, que prohíbe la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados a consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicida o insecticida) en granos para consumo, la ley establece severas penas a los infractores. Recuerde que una bolsa de semilla tratada, mezclada en varios silos de grano para consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa. "En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD: En caso de mezclar con fungicida terapico para tratamiento de semillas, utilizar Tebucu 6 (tebuconazole 6% FS). Para cualquier otra mezcla realizar una prueba de compatibilidad previa.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

NOTA DE GARANTÍA: La empresa elaboradora fabrica este producto con las más estrictas normas de calidad, por lo cual no es responsable por los daños derivados de un uso diferente al especificado en el rótulo, de no haberse tenido las precauciones necesarias y de no conservarlo en las condiciones adecuadas de almacenamiento.

